

Cenflox 200 mg/ml

Solución para administración en agua bebida

Enrofloxacin

- Mycoplasma
- Pasteurella
- Avibacterium
- E. coli



Cenflox 200 mg/ml

Solución para administración en agua bebida

Enrofloxacino



COMPOSICIÓN POR ml:

Enrofloxacino 200 mg
Excipientes, c.s.

ESPECIES DE DESTINO:

Pollos, pavos y conejos.

INDICACIONES:

Pollos: Tratamiento de infecciones causadas por las siguientes bacterias sensibles al enrofloxacino: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*.

Pavos: Tratamiento de infecciones causadas por las siguientes bacterias sensibles al enrofloxacino: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*.

Conejos: Tratamiento de infecciones causadas por *Pasteurella multocida* y enteritis bacteriana causadas por *E.coli*.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar en el agua de bebida.

La dilución debe prepararse diariamente antes de la administración.

Pollos y pavos: 10 mg de enrofloxacino/kg p.v./día, durante 3 - 5 días consecutivos.

Tratamiento durante 5 días consecutivos en caso de infecciones mixtas y en procesos crónicos.

Si no se observa mejoría clínica a los 2 - 3 días, deberá reconsiderarse el tratamiento en base a test de sensibilidad.

Utilice únicamente el agua medicada preparada diariamente justo antes de iniciar el tratamiento.

Conejos: 10 mg de enrofloxacino/kg p.v./día, durante 5 días consecutivos.

TIEMPOS DE ESPERA:

Pollos: Carne: 7 días. **Pavos:** Carne: 13 días. **Conejos:** Carne: 3 días

Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta.

PRESENTACIONES:

Frasco de 1 l. Bidón de 5 l

Reg. nº: 3321 ESP

Uso veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

