

Cendox 500 mg/g

Hiclato de doxiciclina



- **Alta solubilidad**
- **Estabilidad prolongada**
- **Tiempo de espera en cerdos: 48h**



Cendox⁵⁰⁰ mg/g

Hiclato de doxiciclina

Polvo para administración en agua de bebida o en leche

COMPOSICIÓN:

Sustancia activa:

Doxiciclina (hiclato)500 mg

Excipiente:

Ácido cítrico anhidro, c.s.p.....1 g

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES DE USO:

Para tratar las infecciones causadas por las siguientes bacterias sensibles a la doxiciclina:

Cerdo de engorde: tratamiento de procesos infecciosos incluidos dentro del complejo respiratorio porcino, causado por microorganismos sensibles a la doxiciclina tales como *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Pollos de engorde: para tratar colibacilosis y el Síndrome Respiratorio Crónico, causadas por *Escherichia coli* y *Mycoplasma gallisepticum*, respectivamente.

Terneros prerrumiantes: infecciones del tracto respiratorio causado por las especies sensibles, como son *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica*.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Pollos y cerdos de engorde: Vía oral, administración en agua de bebida.

La dosificación se realizará por pesada con el equipo estándar que se disponga y las soluciones medicadas deberán prepararse inmediatamente antes de la administración según la posología indicada en cada caso.

Pollos de engorde: 15 mg de doxiciclina/kg p.v./día durante 3-5 días (equivalente a 30 mg del medicamento/kg p.v./ día).

Cerdos de engorde: 10 mg de doxiciclina/kg p.v./día durante 5 días (equivalentes a 0,2 g de medicamento/10 kg de p.v./día).

Terneros prerrumiantes: Vía oral disuelto en leche, atemperado a 37°C y administrado dentro de los siguientes 60 minutos.

10 mg de doxiciclina / kg p.v./ día (equivalente a 0,2 g de medicamento/10 kg de p.v./día) durante 5 días.

Estimar diariamente la cantidad total requerida del fármaco según el peso de los animales a tratar y añadir a la leche.

TIEMPO DE ESPERA:

Carne: Pollos de engorde: 7 días

Cerdos de engorde: 2 días

Terneros prerrumiantes: 7 días

Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano, ni en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

PRESENTACIONES:

Envases de 200 g y 1 kg

Uso veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Reg. nº: 2283 ESP

