


Florfenicen 300 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino y porcino
Florfenicol



**Directo
a la infección**



Florfenicen 300 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino y porcino
Florfenicol

Directo a la infección

COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:

Florfenicol 300,0 mg

Excipientes

ESPECIES DE DESTINO:

Bovino, ovino y porcino.

INDICACIONES:

En bovino: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Histophilus somni*, sensibles al florfenicol.

En ovino: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio en ovino causadas por cepas de *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida*, sensibles al florfenicol.

En porcino: Tratamiento de brotes agudos de enfermedades respiratorias causadas por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles al florfenicol.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración: intramuscular o subcutánea en bovino; intramuscular en ovino y porcino.

Bovino: **Vía IM:** 20 mg/kg peso vivo (**1 ml/15 kg**) dos veces con un intervalo de 48 horas utilizando una aguja de 16 de galga. **Vía SC:** 40 mg/kg peso vivo (**2 ml/15 kg**) en dosis única utilizando una aguja de 16 de galga. El volumen administrado por punto de inyección no debería exceder de 10 ml en ambas vías de administración (intramuscular y subcutánea). La inyección debe realizarse en el cuello.

Ovino: 20 mg/kg peso vivo (**1 ml por 15 kg**) una vez al día por vía intramuscular durante tres días consecutivos. El volumen administrado por punto de inyección no debería exceder de 4 ml.

Porcino: 15 mg/kg peso vivo (**1 ml/ 20 kg**) por vía intramuscular en el músculo del cuello dos veces con un intervalo de 48 horas utilizando una aguja de 16 de galga.

El volumen administrado por punto de inyección no debería exceder de 3 ml.

TIEMPO DE ESPERA:

Bovino: Carne: Vía intramuscular (20 mg/kg peso vivo, dos veces): 30 días.

Vía subcutánea (40 mg/kg peso vivo, dosis única): 44 días.

Ovino: Carne: 39 días.

Leche (Bovino y ovino): Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano ni en animales gestantes cuya leche se utiliza para consumo humano.

Porcino: Carne: 18 días.

PRESENTACIÓN:

Viales 100 ml y 250 ml.

Uso veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Reg. nº: 2621 ESP