




dipacxon-39

Cipermetrina 10%

dipacxon plus

Cipermetrina 10% + Tetrametrina 6%



Piojos



Garrapatas



Mosquitos



Moscas



dipacxon-39

Cipermetrina 10%

COMPOSICIÓN POR ML:

Cipermetrina 100 mg
Disolvente, c.s.

INDICACIONES: Insecticida de uso ganadero.

ADMINISTRACIÓN: Pulverización o aspersión.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: En general usar entre el 0.2% (2 ml / l agua) y el 1% (10 ml / l de agua). Según la intensidad de la infestación, porosidad de la superficie y condiciones climáticas.

Para insectos voladores: 10 ml en 5 litros de agua.

Desinsectación habitual: 25 ml en 5 litros de agua.

Infestaciones fuertes: 50 ml en 5 litros de agua.

Reaplicaciones: 10 ml en 5 litros de agua.

Verter la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir agua y sin agitar se formará una emulsión estable.

Utilizar la mezcla el día de su preparación.

Aplicar el tratamiento en ausencia de animales.

PLAZO DE SEGURIDAD: 24 horas.

dipacxon plus

Cipermetrina 10% + tetrametrina 6%

COMPOSICIÓN POR ML:

Cipermetrina 100 mg
Tetrametrina 60 mg

Excipientes idóneos, c.s.

INDICACIONES: Insecticida-acaricida de uso en el entorno ganadero.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Se aplica por pulverización o aspersión, diluido en agua, según dosis especificada.

Para insectos voladores: 2,5 mL en 1 L de agua (0,25%).



Desinsectación habitual: 5 mL en 1 L de agua (0,5%).

Infestaciones fuertes: 10 mL en 1 L de agua (1%).

Reaplicaciones: 2,5 mL en 1 L de agua (0,25%).

Realizar limpieza previa al tratamiento. Tanto limpieza previa como tratamiento han de realizarse en ausencia de animales, pienso y agua de los mismos. No aplicar el tratamiento en superficies que vayan a estar en contacto con comida o bebida de los animales. Utilizar la mezcla el día de su preparación. Aplicar el tratamiento en ausencia de animales.

PLAZO DE SEGURIDAD: Se respetará un plazo de seguridad de 24 horas para pulverización y 48 horas para nebulización.



PRODUCTO	APLICACIÓN	DOSIS	MODO EMPLEO	INDICACIÓN	RECOMENDACIONES
dipacxon-39	Aplicar el producto en todas las superficies de la instalación y en zonas colindantes.	2 - 10 ml / litro de agua. Superficie a tratar con cada litro de solución 5 m ² .	Aplicar las solución preparada por pulverización en todas las superficies a tratar.	Fases adultas.	En función de las infestaciones. Siempre que se observe presencia de plagas. Como norma general cada 3-6 semanas.
dipacxon plus	Aplicar el producto en todas las superficies de la instalación y en zonas colindantes.	2,5 - 10 ml / litro de agua. Superficie a tratar con cada litro de solución 5 m ² .	Aplicar las solución preparada por pulverización en todas las superficies a tratar.	Fases adultas.	En función de las infestaciones. Siempre que se observe presencia de plagas. Como norma general cada 3-6 semanas.