



Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus
Telf. 977 75 72 73 Fax. 977 75 13 98
www.cenavisa.com
E-mail: cenavisa@cenavisa.com

FICHA TÉCNICA:

DINAMIX B

PIENSO COMPLEMENTARIO “DIETÉTICO”

Nº Autorización: αESP43100061



DINAMIX B

PIENSO COMPLEMENTARIO "DIETÉTICO"

COMPOSICIÓN POR KILOGRAMO:

Materias Primas:

Fibra de manzana, Glucosa, Productos de transformación de plantas (*Plantago ovata*, *Daucus carota*, *Quercus robur*, *Krameria triandra*), Cloruro sódico, Cloruro potásico, Fosfato monopotásico, Hidróxido de magnesio, Pectinas, Cloruro cálcico, Lactosa monohidrato, Ácido cítrico anhidro.

Aditivos:

Vitaminas, pro-vitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:

Vitamina B ₁ (3a820)	50 mg
Vitamina B ₂ / Riboflavina	100 mg
Vitamina B ₆ / Piridoxina hidrocloreto (3a831) ...	60 mg
Niacinamida (3a 315)	160 mg
D-Pantotenato cálcico (3a 841)	160 mg
L-Carnitina (3a910)	50 mg

Aminoácidos, sus sales y análogos:

DL-Metionina, técnicamente pura (3c301)	200 mg
--	--------

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta	0,8%	Fuentes de hidratos de carbono	67%
Aceites y grasas brutos.....	6,4%	Citratos	0,05%
Fibra bruta	9,0%	Fósforo	0,7%
Geniza bruta	12,4%	Magnesio	0,05%
Calcio	0,4%	Lisina	0%
Sodio	2,7%	Metionina	0,02%
Potasio	0,59%	Humedad	0,5%
Cloruros	6,2%		

OBJETIVO DE NUTRICIÓN ESPECÍFICO: Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico para apoyar la digestión fisiológica. Prevención y tratamiento de los trastornos (diarrea) y en su convalecencia.

ESPECIES O CATEGORIAS DE ANIMALES: Terneros, Cerdos, Corderos, Cabritos y Potros.

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS: DINAMIX B está formulado para obtener una fuente energética rápida y fácilmente utilizada por el organismo, así como para reponer los electrolitos que el animal pierde en situaciones de diarrea, fiebre o estrés.



INSTRUCCIONES DE USO:

Terneros: diluir 100 g de DINAMIX B en 2 litros de agua tibia o leche tibia (35 – 40 °C). Administrar de 2 a 3 veces al día, durante 3 a 4 días.

Cerdos, corderos, cabritos, potros: administrar 2 g de DINAMIX B /Kg de peso vivo, diluir en 2 litros de agua tibia o leche tibia (35 – 40 °C). Administrar de 2 a 3 veces al día, durante 3 a 4 días.

-Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.

PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 100 g y 1 Kg.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y PROTEGIDO DE LA LUZ.

Nº Autorización: αESP43100061