



# censulfatrim

**Solución inyectable**  
**Sulfadiazina - Trimetoprima**


**Categoría D (EMA)**  
*Grupo de primera elección según el plan europeo de categorización de antibióticos para uso veterinario.*

Infecciones respiratorias

Infecciones genitourinarias

Leche  
48 h

Infecciones gastrointestinales



## Tiempo de espera

**Bovino:** Carne: 12 días. Leche: 48 horas.  
**Porcino:** Carne: 20 días.



# censulfatrim

## Solución inyectable Sulfadiazina - Trimetoprima

### COMPOSICIÓN POR ml:

Sulfadiazina.....200 mg  
Trimetoprima.....40 mg  
Excipientes, c.s.

### ESPECIES DE DESTINO:

Bovino, porcino, caballos, perros y gatos.

### INDICACIONES:

Infecciones sistémicas causadas por microorganismos sensibles a la asociación sulfadiazina-trimetoprima.

La combinación de sulfadiazina y trimetoprima es bactericida y presenta un amplio espectro de acción frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, incluyendo:

**Gram-positivas:** *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*

**Gram-negativas:** *Actinobacillus spp.*, *Bordetella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*

### POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

**Bovino, porcino y caballos:** 12,5 mg de sulfadiazina + 2,5 mg de trimetoprima / kg p.v., **equivalente a 1 ml de CENSULFATRIM / 16 kg p.v.**

- En bovino y porcino, administrar por vía intramuscular o intravenosa lenta. En caso de administración intramuscular, el volumen máximo recomendado por punto de inyección es de 15 ml.
- En caballos, administrar únicamente por vía intravenosa lenta.

**Perros y gatos:** 25 mg de sulfadiazina + 5 mg de trimetoprima / kg p.v., **equivalente a 1 ml de CENSULFATRIM / 8 kg p.v.** Administrar únicamente por vía subcutánea.

En todas las especies, una única inyección podría ser suficiente en procesos no complicados, pero en infecciones graves el tratamiento puede repetirse hasta dos días después de que los síntomas se hayan resuelto, hasta un máximo de 5 días.

### TIEMPOS DE ESPERA:

**Bovino:** Carne: 12 días. Leche: 48 horas

**Porcino:** Carne: 20 días

**Caballos:** Carne: 28 días. No usar en yeguas cuya leche se destine al consumo humano.

### PRESENTACIONES:

Caja con 1 vial de 100 ml, Caja con 1 vial de 250 ml, Caja con 10 viales de 100 ml, Caja con 10 viales de 250 ml.

Reg. nº: 3358 ESP

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria

